

Maria das Graças S. Araújo\*; Jussamara Brito Santos, Híbera L. C. Brandão, Bruno O. Barreto, Cyra M. de Araújo, Isabela O. Moura.

Sabin Medicina Diagnóstica – Salvador– Bahia  
gracita@sabin.com.br

## Objetivos


A esporotricose é uma micose subcutânea causada por fungos termodimórficos do gênero *Sporothrix*. A transmissão ocorre por inoculação traumática, seja por meio do solo contaminado ou através de acidentes com animais contaminados, tendo os felinos um papel de destaque. As espécies patogênicas mais relevantes são *S. schenckii*, *S. brasiliensis*, *S. globosa* e *S. mexicana*. A doença pode se manifestar de quatro formas clínicas: a cutâneo-linfática que representa cerca de 80% dos casos, a cutânea localizada, a forma disseminada (cutânea ou sistêmica) e a extracutânea. A apresentação clínica clássica da esporotricose cutâneo-linfática representa a maior parte dos casos, mas um crescente número de casos com manifestações cutâneas atípicas tem sido relatado na literatura. Trata-se de um caso de esporotricose cutânea fixa com apresentação clínica atípica.

## Casuística e métodos

Paciente de 69 anos, feminino, com história de surgimento de lesões dolorosas e pruriginosas no couro cabeludo há 15 dias. Ao exame físico havia uma placa eritematosa com múltiplas pústulas sobrepostas (figuras 1 e 2) localizada na região frontal de couro cabeludo e porção superior da fronte

## Resultados e conclusões

Paciente de 69 anos, feminino, com história de surgimento de lesões dolorosas e pruriginosas no couro cabeludo há 15 dias. Ao exame físico havia uma placa eritematosa com múltiplas pústulas sobrepostas (figura 1e 2) localizada na região frontal de couro cabeludo e porção superior da fronte. A cultura evidenciou hifas finas hialinas septadas com conidióforo gerando conídios em arranjo de margarida levando ao diagnóstico de esporotricose. Diante do quadro clínico atípico da paciente relatada, o achado das leveduras na histopatologia levou à realização da cultura para fungos, o padrão-ouro para estabelecer o diagnóstico da esporotricose. O caso relatado destaca que a esporotricose é uma doença multifacetada podendo mimetizar outras dermatoses mesmo em paciente Imunocompetente e chama atenção para a ocorrência de esporotricose em residentes de área urbana.



## Referências bibliográficas

- Schechtman RC, Falcão EMM, Carard M, García MSC, Mercado DS, Hay RJ. Sporotrichosis: hyperendemic by zoonotic transmission, with atypical presentations, hypersensitivity reactions and greater severity. An Bras Dermatol. 2022 Jan-Feb;97(1):1-13.
- Silva MB, Costa MM, Torres CC, Galhardo MC, Valle AC, Magalhães Mde A, et al. Esporotricose urbana: epidemia negligenciada no Rio de Janeiro, Brasil/ Urban sporotrichosis: a neglected epidemic in Rio de Janeiro, Brasil. Cad Saude Publica. 2012;28:1867-80.



55°

Congresso Brasileiro de  
Patologia Clínica Medicina  
Laboratorial

32<sup>th</sup> WASPaLM World Congress

Exposição Técnico-Científica | 5 a 8 de setembro | São Paulo, SP - Pro Magno

Realização

SBPC ML

Sociedade Brasileira  
de Patologia Clínica  
Medicina Laboratorial